

ÚDAJE NA VONKAJŠOM OBALE

REDUKTAN

čajovina na redukčnú diétu

Zloženie

Fucus vesiculosus (chaluha bublinatá)15,0g, Frangulae cortex (krušinová kôra)15,0g, Sambuci flos (kvet bazy čiernej)15,0g, Sennae folium (sennový list) 10,0g, Foeniculi fructus (feniklový plod)10,0g, Petroselini radix (petržlenový koreň)10,0g, Sambuci fructus (plod bazy čiernej)10,0g, Betulae folium (brezový list)10,0g, Liquiritiae radix (koreň sladkého drievka)5,0g v 100 g čajoviny.

Farmakoterapeutická skupina

Fytofarmakum

Lieková forma

Čajovina

hmotnosť 100,0g

na vnútorné užitie

Príprava a dávkovanie

1 polievková lyžica čajoviny (5g) sa zaleje šálkou (1/4l) vriacej vody, a po 15 minútach vylúhovania v zakrytej nádobe, sa scedí. Čaj sa nesmie variť. Pije sa teplý a nesladený 1 - 3 x denne pred jedlom. Pri hnačkových ťažkostiach sa pitie čaju obmedzí na 1 x denne, najlepšie večer. Po 14 dňoch sa pitie čaju preruší na ďalších 14 dní, aby sa predišlo možnému návyku a nežiaducim účinkom. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred užitím.

Charakteristika

Čajovina ovplyvňuje metabolizmus. Má účinok prehánajúci (Frangulae cortex, Sennae folium, Fucus vesiculosus, Sambuci fructus) a mierne močopudný (Betulae folium, Petroselini radix)

Indikácie

Pri redukčnej diéte, obezite v spojitosti hlavne so zápchou, ovplyvňuje metabolizmus, pôsobí mierne prehánajúco a močopudne.

Kontraindikácie

Tehotné a dojčiace ženy. Osoby s ochorením srdca a obličiek sprevádzané opuchmi.

Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom spôsobe použitia a dávkovania nie sú známe.

Pri prípadnom výskyte neobvyklých reakcií sa o ďalšom užívaní prípravku poraďte s lekárom.

Interakcie

Dlhodobé užívanie prípravku, súčasné podávanie diuretík a kortikoidov zvyšuje toxicitu kardiotoník (strata elektrolytov hlavne draslíka). Pri súčasnom podávaní analgetík (liekov proti bolesti) s obsahom fenacetínu môže prípravok zvyšovať ich toxicitu pre obličky.

Upozornenie

Pri predávkovaní a nedodržaní odporúčaného spôsobu užívania môže dôjsť k poruche rovnováhy elektrolytov a strate draslíka. Užívanie prípravku ukončite a vyhľadajte lekára.

Číslo šarže:

Použiteľné do :

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti uvedenom na obale

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom a mimo dosahu detí

EAN

Prípravok nie je viazaný na lekársky predpis

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o. , U Národní galerie 470, 156 15 Praha 5-Zbraslav, Česká republika

Registračné číslo

94/0144/72-CS

REDUKTAN

čajovina na redukčnú diétu

záparové vrecká

Zloženie

Fucus vesiculosus (chaluha bublinatá)0,30g, Frangulae cortex (krušinová kôra)0,30g, Sambuci flos (kvet bazy čiernej)0,30g, Sennae folium (senňový list) 0,20g, Foeniculi fructus (feniklový plod) 0,20g,, Petroselinii radix (petržlenový koreň) 0,20g,, Sambuci fructus (plod bazy čiernej) 0,20g,, Betulae folium (brezový list) 0,20g,, Liquiritiae radix (koreň sladkého drievka)0,10g v 1 záparovom vrecku.

Farmakoterapeutická skupina

Fytofarmakum

Lieková forma

Čajovina

20 záparových vreciek po 2,0g

hmotnosť 40,0g

na vnútorné užitie

Príprava a dávkovanie

1 vrecko sa zaleje 1/4l vriacej vody a nechá sa 5 minút vylúhovať v prikrytej šálke. Čaj sa nesmie variť. Pije sa teplý a nesladený 1 - 3 x denne pred jedlom. Pri hnačkových ťažkostiach sa pitie čaju obmedzí na 1 x denne, najlepšie večer.

Po 14 dňoch sa pitie čaju preruší na ďalších 14 dní, aby sa predišlo možnému návyku a nežiaducim účinkom. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred užitím.

Charakteristika

Čajovina ovplyvňuje metabolizmus. Má účinok prehánajúci (Frangulae cortex, Sennae folium, Fucus vesiculosus, Sambuci fructus) a mierne močopudný (Betulae folium, Petroselinii radix)

Indikácie

Pri redukčnej diéte, obezite v spojitosti hlavne so zápchou, ovplyvňuje metabolizmus, pôsobí mierne prehánajúco a močopudne.

Kontraindikácie

Tehotné a dojčiace ženy. Osoby s ochorením srdca a obličiek sprevádzané opuchmi..

Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom spôsobe použitia a dávkovania nie sú známe.

Pri prípadnom výskyte neobvyklých reakcií, sa o ďalšom užívaní prípravku poraďte s lekárom.

Interakcie

Dlhodobé užívanie prípravku, súčasné podávanie diuretík a kortikoidov zvyšuje toxicitu kardiotoník (strata elektrolytov hlavne draslíka). Pri súčasnom podávaní analgetík (liekov proti bolesti) s obsahom fenacetínu môže prípravok zvyšovať ich toxicitu pre obličky.

Upozornenie

Pri predávkovaní a nedodržaní odporúčaného spôsobu užívania môže dôjsť k poruche rovnováhy elektrolytov a strate draslíka. Užívanie prípravku ukončíte a vyhľadajte lekára.

Číslo šarže:

Použiteľné do :

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti uvedenom na obale

Uchovávajúte na suchom mieste pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom a mimo dosahu detí

EAN

Prípravok nie je viazaný na lekársky predpis

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o. , U Národnéj galérie 470, 156 15 Praha 5-Zbraslav, Česká republika

Registračné číslo

94/0144/72-CS

